

VARIETÀ BIANCAME B.



Costitutore

Dipartimento di Colture Arboree- Università di Bologna

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 273 del 22/11/1994

Origine

Provincia di Rimini

I-CAB 19

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Aquilina(Fo) e Volania (Fe)
Forma di allevamento	Nel primo campo a capovolto e nel secondo a G.D.C
Densità di impianto (ceppi/ha)	1.587 (Capovolto) – 1.667 (G.D.C)
Periodo di osservazione	1983 - 1988

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


Grappolo: medio - grosso, piramidale, con ala sviluppata, mediamente compatto.

Acino: medio - grosso, rotondo, buccia sottile, non consistente

Vigoria: elevata

Fertilità: discretamente fertile sulle gemme basali

Produttività: abbondante e costante



<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	I decade di aprile
Fioritura	I° decade di giugno
Invaiatura	I decade di agosto
Maturazione	I° decade di ottobre

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	Media
Oidio	Media

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1,80
Produzione per ceppo (Kg)	9,07
Numero grappoli/ceppo	24
Peso medio grappolo (g)	378
Peso medio acino (g)	2,16
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	20
	pH	3,09
	Acidità totale (g/l)	7,85
	Ac. Tartarico (g/l)	3,27
	Ac. Malico (g/l)	1,09

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

I vini, dotati di titolo alcolico superiore alla media della popolazione, sono anche stati giudicati di buona qualità e con sufficiente carattere di tipicità.