

VARIETÀ TREBBIANO ROMAGNOLO B.



Costitutore

Dipartimento di Colture Arboree - Università di Bologna

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 136 del 24/05/1976

Origine

Sant'Agata sul Santerno (RA)

I-TR 8 T

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Tebano
Forma di allevamento	Capovolto
Densità di impianto (ceppi/ha)	
Periodo di osservazione	1970 - 1976

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


Grappolo: grosso, compatto, conico - piramidale, alato (una)

Acino: medio, sferoide con ombelico persistente e sezione trasversale regolare. Buccia di medio spessore, consistente di color verde con sfumature ambrate

Vigoria: inferiore alla popolazione

Fertilità: discreta

Produttività: regolare e abbondante



<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento:	I decade di aprile
Fioritura:	I° decade di giugno
Invaiatura:	II° decade di agosto
Maturazione:	III° decade di settembre

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	Mediamente sensibile
Oidio	Poco sensibile

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	0,79
Produzione per ceppo (Kg)	
Numero grappoli/ceppo	
Peso medio grappolo (g)	
Peso medio acino (g)	
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

	<i>PARAMETRI ENOCIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	19,7
	pH	3,00
	Acidità totale (g/l)	9,00
	Ac. Tartarico (g/l)	6,90
	Ac. Malico (g/l)	1,67

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone ***TR 8 T*** produce un vino di buona acidità e struttura