

**Costitutore**

CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità
Staccata di Grugliasco (TO)

Università degli Studi di Torino - Di.Va.P.R.A.

Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A.

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 194 del 20/08/2008

Origine

Riomaggiore (SP)

I-CVT 18

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monterosso (SP)	Castelnuovo Magra (SP)
Forma di allevamento	-	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	6000/5000	2600
Periodo di osservazione	1987-1989/2000-2001	1987-1989

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigore vegetativo superiore (*)
- ✓ Fertilità maggiore (*)
- ✓ Produttività buona e leggermente superiore (*)
- ✓ Ottima tolleranza alla muffa grigia

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiaura	-
Maturazione	-

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio piccolo, medio-lungo, cilindrico-piramidale allungato con più ali, spargolo
- ✿ Acino sferoide, giallo-verdastro, con piccole macchie rugginose nella parte esposta al sole, peduncolo medio-corto, legnoso nel primo tratto

(*) Rispetto al clone di riferimento I-CVT 3

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE (**)</i>	<i>CLONE (***)</i>
Fertilità reale	-	-
Produzione per ceppo (Kg)	2,87	3,10
Numero grappoli	10,9	14,3
Peso medio grappolo (g)	285	202
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)		933
Indice di Ravaz	-	-

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE (**)</i>	<i>CLONE (***)</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	19,58	21,2
	pH	3,21	3,18
	Acidità totale (g/l)	6,92	6,73
	Ac. Tartarico (g/l)	5,48	6,29
	Ac. Malico (g/l)	1,90	1,53

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

(**) Località Monterosso

(***) Località Castelnuovo Magra