# CORTESE B.

**Costitutore**
Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**
G.U. n. 189 del 14/08/2010

**Origine**
Gavi (AL)

I-UNIMI-VITIS VV 41

## *Campo di omologazione e confronto*

| | |
|---|---|
| Ubicazione | Gavi (AL) |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 5600 |
| Periodo di osservazione | 2006-2008 |

## *Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione*

✓ **Grappolo** di peso medio inferiore

✓ Fertilità superiore

| *Fase fenologica* | *Epoca* |
|---|---|
| Germogliamento | Tardivo |
| Fioritura | Media |
| Invaiatura | Tardiva |
| Maturazione | Medio-tardiva |



## *Il Grappolo*

- Grappolo medio, piuttosto spargolo; conico-piramidale, a volte alato
- Acino medio grande, leggermente ellissoide; buccia di buona consistenza, non molto pruinosa, di color giallo ambrato dalla parte del sole, verde-giallognolo nella parte all'ombra

| CARATTERISTICHE PRODUTTIVE | CLONE |
|---|---|
| Fertilità reale | 1,17 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 3,6 |
| Numero grappoli/ceppo | 10,6 |
| Peso medio grappolo (g) | 351 |
| Peso medio acino (g) | 2,1 |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

| | PARAMETRI ENOCHIMICI | CLONE |
|---|---|---|
| MOSTO | Zuccheri (° Brix) | 21,2 |
| | pH | - |
| | Acidità totale (g/l) | 5,6 |
| | Ac. Tartarico (g/l) | 3,13 |
| | Ac. Malico (g/l) | 0,83 |

## ANALISI SENSORIALE




## DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Nell'anno 2007 il clone si è differenziato per la produzione di un vino complesso e molto aromatico, apprezzabile la freschezza. Clone adatto alla produzione di vini sia d'annata sia di medio invecchiamento.
Per valorizzare il profilo aromatico se ne consiglia la produzione in acciaio, da solo o in taglio con il CORT VV49.