

Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 297 del 22/12/2001

Origine

Valdobbiadene (TV) e Farra di Soligo (TV)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO			
Ubicazione	Piavon di Oderzo (TV); Susegana (TV)		
Forma di allevamento	-		
Densità di impianto (ceppi/ha)	-		
Periodo di osservazione	-		

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Produttività buona e costante
- ✓ Buona resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, giustamente spargolo
- Acino ovale

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite Oidio

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI		CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	-
9	рН	-
MOST	Acidità totale (g/l)	-
MG	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino ottimamente strutturato con buon corpo e di acidità sostenuta, con evidenti sensazioni olfattive di frutta matura, vegetale fresco e speziato. Adatto all'appassimento.