

GRECHETTO B.



Costitutore

Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di
Arboricoltura e Protezione delle Piante

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 295 del 19/12/1994

Origine

Todi (PG)

I-G 5 ICA-PG

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione contenuta
- ✓ Buona resistenza alla siccità
- ✓ Media resistenza alle crittogame

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Medio
Fioritura	-
Invaiaura	-
Maturazione	-

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo piccolo, cilindrico, raramente alato, compatto
- ✿ Acino piccolo, leggermente ellittico, con buccia di colore giallo-verdognolo, di medio spessore, poco pruinosa, ombelico evidente, sapore semplice



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	136
Peso medio acino (g)	1,14
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	-
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino, sapore fruttato, sapido, profumato. Adatto per vinificazione in purezza ed è miglioratore negli uvaggi.