PECORINO B.

Costitutore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

I-1 ISV

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	loc. San Savino, Ripatransone (AP); loc. San Felice, Giano (PG)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Cappuccina e a Cortina semplice
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità
- ✓ Produttività

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	III decade Marzo
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, cilindrico, con un'ala, compatto
- Acino medio, sferico

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	*CLONE*
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	*CLONE*
Fertilità reale	0,98
Produzione per ceppo (Kg)	4,38
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	242,10
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	475
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	*CLONE*
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	23,03
	pH	3,35
	Acidità totale (g/l)	6,38
	Ac. Tartarico (g/l)	5,23
	Ac. Malico (g/l)	1,85

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino è da preferirsi allo standard per la superiore intensità dei profumi e per la persistenza del gusto, in particolare delle componenti aromatiche della mela e dei fiori freschi. Nel complesso si caratterizza per la qualità migliore.