

PINOT NERO N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine

FPMS – Davis University Ca. (15)

ISV 15

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV); Vivai Coop. Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1995-1997

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Fertilità buona e costante

✓ Produzione buona

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento

II decade Aprile

Fioritura

I decade Giugno

Invaiatura

II decade Agosto

Maturazione

-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite

-

Oidio

-

IL GRAPPOLO

■ Grappolo medio, semispargolo, cilindrico, con corte ali

■ Acino medio

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1,00
Produzione per ceppo (Kg)	1,07
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	1,07
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	-
	pH	2,98
	Acidità totale (g/l)	9,60
	Ac. Tartarico (g/l)	-
VINO	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/l)	118
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino