

ROSSIGNOLA N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura;
Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Affi (VR)

I-ISV-CV 7

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|--|
| Ubicazione | S. Giorgio in Salici (VR), S. Pietro in Cariano (VR) |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | 2100 |
| Periodo di osservazione | 1976-1978 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Molto vigoroso
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività elevata

| <i>FASE FENOLOGICA</i> | <i>EPOCA</i> |
|-------------------------------|----------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | II decade Giugno |
| Invaiaura | III decade Agosto |
| Maturazione | III decade Settembre |



IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo cilindrico, alato, tendenzialmente spargolo
- ✚ Acino medio, rotondeggiante

| <i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i> | <i>CLONE</i> |
|--|---------------------|
| Fertilità potenziale delle gemme | 0,98 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 10,90 |
| Peso medio grappolo (g) | 207,40 |

| | <i>PARAMETRI ENOCIMICI</i> | <i>CLONE</i> |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| MOSTO | Zuccheri (° Brix) | 17,60 |
| | pH | 3,00 |
| | Acidità totale (g/l) | 10,30 |

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo; aroma delicato; abbastanza corposo, vivo di acidità, armonico. Adatto per la preparazione di “base spumante”.