

Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura; Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine Affi (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione S. Giorgio in Salici (VR), S. Pietro in Cariano (VR)

Densità di impianto (ceppi/ha) 2100

Periodo di osservazione 1976-1978


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo più spargolo
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produttività contenuta
- ✓ Minore sensibilità alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-grande, cilindrico, alato, tendenzialmente spargolo
- Acino medio, rotondeggiante



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	0,98
Produzione per ceppo (Kg)	9,70
Peso medio grappolo (g)	198,10

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
<u> </u>	Zuccheri (° Brix)	17,80
MOSTO	рН	3,10
M	Acidità totale (g/l)	10,70

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo; aroma delicato; sapore abbastanza armonico, leggermente salatino, di acidità piuttosto sostenuta, liscio, gradevole.