

Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

 $\widetilde{\text{Conegliano}}(TV)$

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO		
Ubicazione	Susegana (TV), Spresiano (TV)	
Densità di impianto (ceppi/ha)	1800	
Periodo di osservazione	1983 - 1987	


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Fertilità media
- ✓ Buona e costante produttività

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, cilindrico, alato, mediamente compatto
- Acino medio, rotondeggiante



CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE Fertilità potenziale delle gemme	1,50
Produzione per ceppo (Kg)	7,20
Peso medio grappolo (g)	110

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
2	Zuccheri (° Brix)	20,4
	рН	3,20
M	Acidità totale (g/l)	7,70

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo dorato chiaro, aroma tenue, delicato; sapore asciutto, armonico ed equilibrato.

Il clone fornisce un vino elegante con aroma caratteristico di giusta intensità.